



REGIONE SICILIANA



# CONOSCERE E PREVENIRE **VACCINI IN GRAVIDANZA**



Collana editoriale a cura di  
Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute  
Dirigente responsabile  
dott.ssa Daniela Segreto

## SAI QUALI SONO I VACCINI RACCOMANDATI IN GRAVIDANZA?

In gravidanza, i vaccini inattivati come anti-DTPa (difterite, tetano e pertosse), l'antinfluenzale e l'anti Covid-19, possono essere somministrati in momenti differenti per proteggere la mamma, il nascituro ed il neonato nei primi mesi dopo il parto.

## SAI QUALI SONO I VANTAGGI?

La vaccinazione della mamma protegge il neonato attraverso il passaggio di anticorpi tramite la placenta, permettendo sin dalla nascita l'immunità e la protezione nei confronti di virus e batteri. Inoltre **protegge la mamma da influenza e COVID-19** che sono molto temibili se contratti in gravidanza.

## ANDIAMO A CONOSCERLI MEGLIO...

### VACCINAZIONE ANTI - INFLUENZALE

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata durante la stagione epidemica (ogni anno da ottobre a febbraio) ed in qualsiasi trimestre di gravidanza (anche durante il primo, a dimostrazione della massima sicurezza dei vaccini). Contrarre l'influenza durante la gravidanza è significativamente associato a:

- eccesso di mortalità e ospedalizzazione nella madre;
- aborti e anomalie congenite nel nascituro (difetti del tubo neurale e di chiusura del palato molle e del palato posteriore);
- aumentato rischio di contrarre patologie respiratorie nel neonato.



La vaccinazione infatti garantisce un'importante risposta immunitaria nei confronti dei virus influenzali riducendo ospedalizzazioni, decessi e patologie respiratorie neonatali nei primi sei mesi di vita.

## VACCINAZIONE DTPa

Il periodo ideale per tale vaccinazione in gravidanza è compreso tra la **27esima** e la **36esima settimana**; la vaccinazione deve essere effettuata ad ogni gravidanza a prescindere dallo storia vaccinale della madre.

### Perché è importante?

La pertosse contratta dal neonato durante le prime settimane di vita, può portare anche ad esiti fatali. **Vaccinare la mamma vuol dire garantire una protezione anticorpale al feto** per passaggio transplacentare, proteggendolo da ogni rischio e dal possibile contagio entro il terzo mese, quando farà il vaccino esavalente che contiene per l'appunto anche gli antigeni contro la pertosse. La pertosse nel bambino piccolo non può essere evitata con il classico isolamento del neonato. Sapevi infatti che nel 55% dei casi la fonte di trasmissione è dovuta ad uno dei genitori?

Anche il papà e i nonni, così come le altre persone che si prenderanno cura del bambino, possono vaccinarsi contro la pertosse in modo da creare una barriera di protezione verso il neonato.

Il vaccino riduce anche il rischio di tetano neonatale che aumenta il tasso di letalità dei neonati nelle mamme non vaccinate.

## VACCINAZIONE ANTI COVID 19

**Le donne in gravidanza possono essere vaccinate per COVID-19?**

**Decisamente Sì!**

Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA (anche come dose booster dopo almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario), alle donne in gravidanza nel **secondo e terzo trimestre** e per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l'allattamento.

Inoltre raccomanda di valutare anche nel primo trimestre di vaccinare qualora il rapporto rischio-beneficio sia a favore della vaccinazione.

## LO SAI CHE..

- La dose di richiamo anti – COVID (booster) può essere somministrata contestualmente alle vaccinazioni contro l'influenza e la pertosse?
- Tutti i vaccini in gravidanza si possono somministrare nelle due braccia ed è possibile farli anche a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro?



## CAMPAGNA VACCINALE IN GRAVIDANZA

Chiedi al tuo ginecologo, al tuo medico di famiglia o al tuo pediatra di fiducia

Oppure visita il sito [vaccinarsinsicilia.org](http://vaccinarsinsicilia.org)







# NON SERVONO I SUPER POTERI PER PROTEGGERE CHI AMI

## I vaccini in gravidanza proteggono TE e il tuo BAMBINO

**Vaccinazione anti COVID-19** raccomandata durante il I, II e III trimestre (anche come dose booster);

**Vaccinazione anti - influenzale** durante la stagione della vaccinazione anti influenzale (ogni anno da ottobre a febbraio);

**Vaccinazione anti Difterite - Tetano - Pertosse** tra 27esima settimana di gestazione da ripetere ad ogni gravidanza.



Hanno partecipato alla realizzazione della presente brochure:  
la dott.ssa **Alessandra Fallucca**, il dott. **Luciano D'Azzo**,  
la dott.ssa **Patrizia Ferro**, il dott. **Angelo Fertitta**, il dott.  
**Claudio Costantino**, la dott.ssa **Daniela Segreto**.

Un particolare ringraziamento al Dipartimento ProMISE Scuola di Specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva" e Corso di Studi in "Assistenza Sanitaria" dell'Università degli Studi di Palermo.